UPRAWY SZKLARNIOWE 2026

ABC
ochrony szklarni

WIELOZADANIOWI SPECJALIŚCI

PREVICUR® ENERGY

PODLEWANIE (rośliny uprawiane na wełnie mineralnej)

- Pomidor
- Ogórek

- Zgnilizna pierścieniowa
- Zgorzele siewek
- Zgnilizny korzeni

- **Termin stosowania:** BBCH 10-19
- **Zalecane stężenie/dawka:**
  – 0,015-0,03% (15-30 ml środka w 100 litrach wody)
  – Dozowanie poprzez system nawadniania kroplowego: 1-2 l środka na 25000 roślin. Rośliny podlewać 1-2 razy w odstępach, co 2-3 tygodnie
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 2
- **Odstęp między zabiegami:** 14 dni

OPRYSKIWANIE

- Pomidor
- Ogórek

- Zaraza ziemniaka
- Mączniak rzekomy dyniowatych

- **Termin stosowania:**
  Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby
  – Pomidor BBCH 16-85 od fazy rozwiniętego 6-go liścia na pędzie głównym do fazy, gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę
  – Ogórek BBCH 14-89 od fazy rozwiniętego 4-go liścia na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców
- **Zalecana ilość wody:** 500-1500 l/ha
- **Zalecane stężenie/dawka:**
  – 0,17 l środka/100 l wody (0,17%)
  – 2,5 l/ha (1,0 l/10 000 m2 LWA tj. powierzchni ściany liści)
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 2
- **Odstęp między zabiegami:** co najmniej 7 dni
- **Okres karencji:** 3 dni

OCHRONA **BEZ** POZOSTAŁOŚCI

RHAPSODY®

BIOLOGICALS by Bayer

- Pomidor
- Papryka
- Oberżyna
- Ogórek

- Fuzarioza zgorzelowa

- **Termin stosowania:** BBCH 00
  Stosować przed sadzeniem rośliny uprawnej
- **Zalecana dawka:** 10 l/ha
- **Zalecana ilość wody:** 200-500 l/ha
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 1
- **Okres karencji:** nie dotyczy

- Ogórek

- Mączniak prawdziwy dyniowatych
- Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka

- **Termin stosowania:** BBCH 21-89
  Środek stosować zapobiegawczo, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców
- **Zalecana dawka:** 8 l/ha
- **Zalecana ilość wody:** 400-800 l/ha
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 6
- **Odstęp między zabiegami:** co najmniej 5 dni
- **Okres karencji:** nie stosować w dniu zbiorów

- Pomidor
- Papryka
- Oberżyna

- Szara pleśń
- Alternarioza
- Bakteryjna cętkowatość

- **Termin stosowania:** BBCH 21-89
  Środek stosować zapobiegawczo, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców
- **Zalecana dawka:** 8 l/ha
- **Zalecana ilość wody:** 500-1000 l/ha
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 6
- **Odstęp między zabiegami:** co najmniej 5 dni
- **Okres karencji:** nie stosować w dniu zbiorów

WIELOZADANIOWI SPECJALIŚCI

TELDOR®

- Pomidor
- Papryka
- Oberżyna
- Ogórek

- Szara pleśń

- **Termin stosowania:** BBCH 12-89
  Środek o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
- **Zalecana dawka:**
  – 1,5 l/ha (pomidor, papryka, oberżyna)
  – 1,0 l/ha (ogórek)
- **Zalecana ilość wody:** maksymalnie 1200 l/ha
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 3
- **Odstęp między zabiegami:** co najmniej 7 dni
- **Okres karencji:**
  – 3 dni (pomidor, papryka, oberżyna)
  – 1 dzień (ogórek)

SIVANTO® prime

- Pomidor
- Papryka
- Oberżyna
- Ogórek

- Mączliki
- Mszyce

- **Termin stosowania:** BBCH 12-89
  Środek stosować od fazy rozwiniętego 2-go liścia
- **Zalecana dawka:**
  – mączliki, mszyca ogórkowa: 0,56 l/ha na 1m wysokości rośliny (maks. 1,12 l/ha na roślinę o wysokości 2m)
  – mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa: 0,45 l/ha na 1m wysokości rośliny (maks. 0,9 l/ha na roślinę o wysokości 2 m)
- **Zalecana ilość wody:** 500-750 l/ha
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 2
- **Odstęp między zabiegami:** co najmniej 10 dni.
- **Okres karencji:** 3 dni

FiTTER®

BIOLOGICALS by Bayer

- Pomidor
- Ogórek

- Mączliki
- Mszyce
- Przędziorki

- **Termin stosowania:**
  Środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników.
- **Zalecana dawka:** 3-16 l/ha (stężenie 1-2%)
- **Zalecana ilość wody:** 300-1000 l/ha
- **Maksymalna liczba zabiegów:** 5
- **Odstęp między zabiegami:** co najmniej 7 dni
- **Karencja:** 1 dzień

VYNYTY® TUTA PRESS – NOWOŚĆ OD BAYER

VYNYTY® Tuta Press

ZALETY VYNYTY® TUTA PRESS

- Środek ochrony roślin w formie produktu wytwarzającego pary (VP)
- Zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły
- Dawka 4-6 worków na hektar (750-800 punktów aplikacyjnych – kropli)
- Wskazana równa odległość między kroplami, jedna kropla na 12-15 m^2
- Dla najlepszej ochrony szklarni zwiększamy liczbę punktów aplikacyjnych (żel) na końcach rzędów, jak również w pobliżu okien, wietrzników
- Punkty aplikacyjne muszą znajdować się na obojętnych powierzchniach, np. worki podłoża, substratu
- Jedno zastosowanie chroni uprawę przez około 3–4 miesiące, w zależności od klimatu i warunków panujących w szklarni

Skontaktuj się z doradcą

Radosław Suchorzewski	668 131 003
Tomasz Gasparski	604 158 566

Dowiedz się wiecej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa
www.agro.bayer.com.pl

Zapytaj o nasiona DEKALB i środki ochrony roślin Bayer
600 294 400